

แนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่



- พบสูติแพทย์รับคำปรึกษา เตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์

♥ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

- ฝากครรภ์ ดูแลระหว่างตั้งครรภ์ ทานยาบำรุงตามแพทย์สั่ง



♥ 4-5 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

- ▶ ประเมินทารกในครรภ์ (20 สัปดาห์)

- ▶ รับคำแนะนำระหว่างการตั้งครรภ์



แรกเกิด - 6 เดือน


- ▶ พบพยาบาลที่ศูนย์ตะวันฉาย

- ▶ พบศัลยแพทย์และกุมารแพทย์



- ▶ พบทันตแพทย์

- ใส่เพดานเทียม / ทำนม (NAM)



- ▶ พบพยาบาล ตึก 2 ข ฝึกการป้อนนมและการดูแลเรื่องการให้นม



อายุ 3-6 เดือน

- ▶ ผ่าตัดเย็บริมฝีปาก
- ▶ ตรวจหู ตรวจการได้ยิน



- ▶ วัดและกระตุ้นพัฒนาการ
- ▶ ประเมินส่งเสริมการพูด
- ▶ พบทันตแพทย์สำหรับเด็กเพื่อป้องกันฟันผุ



อายุ 10-18 เดือน

- ▶ ผ่าตัดปิดเพดานโหว่



- ▶ ฝึกพูดหลังผ่าตัด



- ▶ ติดตามการรักษาตามแพทย์นัด

อายุ 1 ปีครึ่ง - 3 ปี

- ▶ ผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วของเพดานปาก(ถ้ามี)



- ▶ ดูแลสุขภาพฟัน



- ▶ ฝึกพูด



- ▶ ติดตามการรักษาตามนัด

อายุ 4-5 ปี

- ▶ ผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วของเพดานปาก (กรณีจำเป็น)
- ▶ ผ่าตัดแก้ไขริมฝีปาก (กรณีจำเป็น)
- ▶ ประเมินความบกพร่องของการทำงานของเพดานอ่อนและผนังคอหอย (กรณีจำเป็น)

อายุ 7-12 ปี

- ▶ ผ่าตัดแก้ไขปัญหาความบกพร่องของการทำงานของเพดานอ่อนและผนังคอหอย (กรณีจำเป็น)
- ▶ ตรวจสอบการสบฟันที่ผิดปกติ
- ▶ เตรียมช่องปากและฟัน
- ▶ ผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสันหลังเอียง



อายุ 13-15 ปี

- ▶ จัดฟันต่อเนื่อง (หลังปลูกกระดูกสันหลังเอียง)
- ▶ ติดตามการรักษาตามนัด



อายุ 16-18 ปี

- ▶ ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกและขากรรไกรและใบหน้า (กรณีจำเป็น)



อายุ 18 ปีขึ้นไป

- ▶ ผ่าตัดตกแต่งรูปร่างริมฝีปาก และจมูก
- ▶ ผ่าตัดแก้ไขปัญหาด้านการพูด (กรณีจำเป็น)
- ▶ ทบทวน ประเมินผลการรักษา
- ▶ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา การดำรงชีวิต การเสริมพลังอำนาจ เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี